

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian Efek Samping Obat Anti Tuberkulosis terhadap kepatuhan minum obat pada pasien Tb Paru di Puskesmas Kecamatan Balen dapat disimpulkan bahwa :

1. Responden sebagian besar mengalami efek samping ringan yaitu sebanyak (35%) dan efek samping berat yaitu sebanyak (65%) dan pada keluhan efek samping sebagian besar mengalami keluhan efek samping pada urine berwarna merah sebanyak (40%), gangguan penglihatan sebanyak (35%) dan nyeri sendi sebanyak (25%)
2. Responden sebagian besar patuh dalam mengkonsumsi Obat Anti Tuberkulosis (OAT) yaitu sebanyak 48 pasien (96 %) dan 2 pasien (3,8%) tidak patuh dalam mengkonsumsi Obat Anti Tuberkulosis (OAT)
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara Efek samping Obat Anti Tuberkulosis (OAT) terhadap kepatuhan minum obat pada pasien TB paru, yang artinya meskipun responden mengalami efek samping obat, tidak akan mempengaruhi kepatuhan mereka dalam melakukan pengobatan.

5.2 Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya melakukan penelitian Bersifat kualitatif dengan melakukan wawancara yang lebih teliti kepada penderita sehingga bisa mengukur variabel penelitian lebih mendalam dan lebih mendapatkan hasil yang baik.

2. Untuk masyarakat

Untuk masyarakat dapat lebih meningkatkan kepatuhan dalam berobat dan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang telah di sediakan dengan baik untuk mewujudkan angka kesembuhan yang lebih tinggi.

3. Untuk Instalasi Farmasi

Untuk instalasi farmasi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik serta pada saat pemberian obat bisa disertakan dengan pemberian KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) agar pasien bisa lebih memahami bagaimana cara penggunaan obat dengan tepat

4. Untuk pemerintah

Untuk pemerintah lebih memperhatikan dan mengupayakan program promotif dan preventif seperti skrining sehingga dapat terdeteksi secara dini masyarakat yang mengalami gejala Tuberculosis serta mengurangi dampak yang lebih parah



UNUGIRI